

# Optional Math of Waves

This is a brief survey of the math required to analyze waves at the first or second year university level.

## Real numbers

Try to fill in the blank. If  $(5) \times (5) = 25$  and  $(-5) \times (-5) = 25$ , what number (and it has to be the same number) can you put in the box so that:

$$\boxed{\phantom{00}} \times \boxed{\phantom{00}} = -25$$

It turns out that nowhere on the real number line is there a number such that when you multiply it by itself you get a negative number: two positive numbers give a positive number, and two negative numbers also give a positive number.

But could we *invent* one?

## Complex Numbers

Let's create an imaginary number called  $i$  such that:

$$i = \sqrt{-1} \Rightarrow i^2 = -1$$

Even if  $i$  is not in  $\mathbb{R}$ , we can nonetheless perform interesting mathematical operations with it:

- We can multiply:

$$(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$$

- We can find roots:

$$\begin{aligned} z^4 = 16 &\Rightarrow z^2 = \sqrt[4]{16} \Rightarrow z = \pm 2 \\ z^8 = 256 &\Rightarrow z^4 = \sqrt[8]{256} = \sqrt[4]{16} \Rightarrow z^2 = \pm 2 \\ z^2 = 2 &\Rightarrow z = \pm \sqrt{2} \\ z^2 = -4 &\Rightarrow z = \pm 2i \\ z^2 = 4i &\Rightarrow z = \pm \sqrt{2(1+i)} = \pm \sqrt{2}\sqrt{1+i} = \pm \sqrt{2}\sqrt{2}i = \pm 2i \end{aligned}$$

## A Little Philosophy

If these weird numbers follow all of the algebra rules without inconsistencies, does it mean they exist as much as the real numbers? Aren't complex numbers a mere *creation* by mathematicians? Is mathematics discovered or created? In a certain way, negative numbers are just as weird as complex numbers: after all, we know what 5 cars look like, but -5 cars?

## Plan complexe

Pour représenter un nombre complexe graphiquement: Par exemple:  $z^8 = 256$ :



: geogebra

Les points noirs:  $z = a + ib$  sont des solutions de l'équation  $z^n = w$ . On remarque:

- ...
- ...
- ...

### Exercices

- Graphiquement, quelles seraient les solutions de  $z^3 = 8$  ?
- Comment pourraient-on calculer ces nombres algébriquement?
- Algébriquement, calculer les racines de  $z^2 = 2i$  et vérifier vos réponses avec le graphique ci-dessous.



: Geogebra

## Forme Polaire

Comme pour les vecteurs, les nombres complexes peuvent être exprimés en coordonnées cartésiennes ou polaires.



: Geogebra

Pour convertir d'une représentation à l'autre, on utilise Pythagore et un peu de trigonométrie:

$a + ib \rightarrow r\angle \theta$	$r\angle \theta \rightarrow a+ib$
$r^2 = a^2 + b^2$	$a = r\cos\theta$
$\tan \theta = \frac{b}{a}$	$b = r\sin\theta$

### Exercices

- Convertir  $6 \angle \frac{\pi}{3}$  en coordonnées cartésiennes.
- Convertir  $8 - 2i$  en coordonnées polaires.

## Formule de Euler

La formule de Euler expose une relation très profonde entre les fonctions trigonométriques et les fonctions exponentielles <sup>1)</sup>:  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

Vérifions cette identité mystérieuse de deux façons.

## La dérivée

Si on sépare cette identité en deux fonctions et qu'on prend la dérivées de ces deux fonctions, on remarque que:

$$\begin{aligned} \text{Si } f(\theta) &= e^{i\theta} \text{ et } g(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta \\ \Rightarrow f'(\theta) &= i e^{i\theta} \text{ et } g'(\theta) = -\sin \theta + i \cos \theta \end{aligned}$$

On sait qu'il n'y a qu'une fonction  $h(x)$  qui satisfasse l'équation différentiel  $h'(x) = ah(x)$ , et qu'elle est:  $h(x) = A e^{ax}$ . Ce que Euler à découvert est que quand  $a = i$  il y a une deuxième fonction qui satisfasse la même équation différentiel! Ces deux fonctions doivent donc être la même.

## Taylor

Une autre méthode de vérifier la formule d'Euler est d'utiliser les séries de Taylor:

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \end{aligned}$$

Si on remplace  $x$  par  $i\theta$  et qu'on additionne les séries de  $\cos \theta$  et  $i \sin \theta$  on obtiendra la série de  $e^{i\theta}$

## Exercices

- Utiliser la formule de Euler pour obtenir ces deux résultats qui seront très pratique:

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \\ \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \end{aligned}$$

- Utiliser la formule de Euler pour démonter d'un seul coup que:

$$\begin{aligned} \cos(\theta + \phi) &= \cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi \\ \sin(\theta + \phi) &= \sin \theta \cos \phi + \cos \theta \sin \phi \end{aligned}$$

- Utiliser les deux résultats de la formule de Euler pour démontrer que:

$$\sin(\theta + \Delta \theta) + \sin(\theta - \Delta \theta) = 2 \cos \Delta \theta \sin \theta \quad (\text{ce qui sera très important quand nous ferons de l'interférence d'onde...})$$

## Équations différentielles

Dans la physique des ondes, on aura bientôt à trouver la solutions d'une équation différentiel de ce type:  $a \ddot{x}(t) + b \dot{x}(t) + c x(t) = 0$

Dans nos applications, les paramètres  $a, b, c$  serons tous des quantités réels et positive. Même sans avoir étudier le sujet d'équation différentiels en profondeurs, on peut imaginer qu'une solution possible serait  $x(t) =$

$e^{rt}$  puisque la dérivé d'une fonction exponentiel est elle même une fonction exponentiel, ce qui est encourageant... L'étape suivante est donc d'essayer cette fonction dans l'équation différentiel, pour trouver les valeurs de  $r$  qui fonctionnent. Donc:

$$\begin{aligned} & \begin{aligned*} & x(t) = e^{rt} \\ & \Rightarrow \dot{x}(t) = r e^{rt} \\ & \Rightarrow \ddot{x}(t) = r^2 e^{rt} \end{aligned*} \end{aligned}$$

et notre équation différentiel devient:

$$\begin{aligned} & \begin{aligned*} & a \ddot{x}(t) + b \dot{x}(t) + c x(t) = 0 \\ & \Rightarrow (r^2 e^{rt}) + b(r e^{rt}) + c(e^{rt}) = 0 \\ & \Rightarrow (r^2 + b r + c) e^{rt} = 0 \end{aligned*} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow r = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Puisque  $r$  contient une racine carré, il peut être réel, ou complexe. Pour simplifier la notation, disons que:  $\alpha = \frac{b}{2a}$  et  $\beta = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Nous pourrons donc dire que:  $r = \left\{ \begin{array}{ll} \alpha \pm i\beta & \text{si } b^2 - 4ac > 0 \\ -\alpha & \text{si } b^2 - 4ac < 0 \end{array} \right.$

Examinons les deux cas en plus de détails.

### Cas 1:

Quand  $b^2 - 4ac > 0$ ,  $r$  est réel et la solutions général sera:

$$\begin{aligned} & \begin{aligned*} & x(t) = A_1 e^{(\alpha - \beta)t} + A_2 e^{(\alpha + \beta)t} \\ & \Rightarrow x(t) = A_1 e^{-\alpha t} e^{\beta t} + A_2 e^{-\alpha t} e^{-\beta t} \end{aligned*} \end{aligned}$$

$$x(t) = e^{-\alpha t} (A_1 e^{\beta t} + A_2 e^{-\beta t})$$

C'est normal d'avoir deux constantes d'intégrations puisque notre équation différentiel a une dérivé du second degré. Pour trouver ces constantes, ça nous prendrait des valeurs initiales.

### Cas 2:

Quand  $b^2 - 4ac < 0$ ,  $r$  est complexe et nous utiliserons la formule de Euler pour simplifier notre solutions.

$$\begin{aligned} & \begin{aligned*} & x(t) = A_1 e^{(\alpha - \beta)t} + A_2 e^{(\alpha + \beta)t} \\ & \Rightarrow x(t) = A_1 e^{-\alpha t} e^{\beta t} + A_2 e^{-\alpha t} e^{-\beta t} \\ & \Rightarrow x(t) = e^{-\alpha t} (A_1 \cos(\beta t) + A_2 \sin(\beta t)) \end{aligned*} \end{aligned}$$

Dans les deux derniere ligne, nous avons ré-écrit les constantes d'intégration:

$$\begin{aligned} & \begin{aligned*} & a_1 = A_1 + A_2 \\ & a_2 = i(A_1 - A_2) \end{aligned*} \end{aligned}$$

Pour finalement pouvoir utiliser une identité trigonométrique:

$$\$ \$ x(t) = A e^{-\alpha t} \sin(\beta t + \phi) \$ \$$$

### Exemple

Nous avons donc deux types de solutions complètement différents qui dépendent de trois paramètres \$ a, b, c \$. Pour voir comment ces paramètres affectent le graphique, imaginons qu'une de nos conditions initiales est \$ \phi = \frac{\pi}{2} \$. Ça veut dire que:

$$\$ \$ \begin{aligned} & a_1 = A \sin \frac{\pi}{2} = A \quad \& \quad a_2 = A \cos \frac{\pi}{2} = 0 \\ & \Rightarrow A_1 + A_2 = A \quad \& \quad A_1 - A_2 = 0 \end{aligned} \$ \$$$

Dans ce cas particulier, nous avons donc:

$$\$ \$ \begin{aligned} & x(t) = \left\{ \begin{array}{ll} A e^{-\alpha t} \cos(\beta t) & \text{si } b^2 - 4ac > 0 \\ A e^{-\alpha t} \sin(\beta t) & \text{si } b^2 - 4ac < 0 \end{array} \right. \end{aligned} \$ \$$$



Geogebra

<sup>1)</sup> Note, obtenir "la plus belle équation du monde", on met \$ \theta = \pi \$ dans la formule de Euler...